

Impfstoff	Altersgruppe	Impfabstand	Auffrischung
Comirnaty®	Ab 12 Jahren	3 – 6 Wochen	Auffrischung mit mRNA-Impfstoff nach 6 Monaten*  Bei schwer Immunsupprimierten bereits ab 4 Wochen mgl. (Details siehe epidemiolog. Bulletin)
Spikevax®	Ab 12 Jahren Ab 30 Jahren (STIKO)	4 – 6 Wochen	Auffrischung mit mRNA-Impfstoff nach 6 Monaten*  Bei schwer Immunsupprimierten bereits ab 4 Wochen mgl. (Details siehe epidemiolog. Bulletin)
Vaxzevria® + Comirnaty® oder Spikevax®	Alle Personen mit Erstimpfung Vaxzevria®	Ab 4 Wochen	Auffrischung mit mRNA-Impfstoff nach 6 Monaten*  Bei schwer Immunsupprimierten bereits ab 4 Wochen mgl. (Details siehe epidemiolog. Bulletin)
Vaxzevria®	Ab 60 Jahren (STIKO)	4 – 12 Wochen (am besten 9 – 12 Wochen)	Auffrischung mit mRNA-Impfstoff nach 6 Monaten*  Bei schwer Immunsupprimierten bereits ab 4 Wochen mgl. (Details siehe epidemiolog. Bulletin)
COVID-19 Vaccine Janssen	Ab 60 Jahren (STIKO)	Einmalige Impfung	ab 4 Wochen Optimierung des Impfschutzes mit einem mRNA-Impfstoff und nach weiteren 6 Monaten Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff (bei der Optimierung (nach 4 Wochen) mit dem Impfstoff Spikevax® wird eine Dosis von 0,5 ml verabreicht, bei einer weiteren Auffrischung (nach 6 Monaten) werden 0,25 ml Spikevax® gegeben)
Infektion → einmalige Impfung ausreichend		In der Regel ab 6 Monate nach Diagnose, ab 4 Wochen nach Abklingen der Symptome möglich	Derzeit keine Auffrischung empfohlen**
1. Impfung und danach Infektion		2. Impfung in der Regel 6 Monate nach Ende der COVID-19-Symptome bzw. der Diagnose, ab 4 Wochen nach dem Ende der Symptome möglich.	Derzeit keine Auffrischung empfohlen**
COVID-19 Vaccine Janssen und danach Infektion			Derzeit keine Auffrischung empfohlen**
Nicht in der EU zugelassener Impfstoff (z.B. Sputnik®)		Um den EU-Status „Geimpft“ zu erlangen, ist eine komplette erneute Impfserie (mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff) frühestens 28 Tage nach der voran gegangenen Impfung notwendig.	

\*Für die Auffrischimpfung soll möglichst der mRNA-Impfstoff benutzt werden, der bei der Grundimmunisierung zur Anwendung gekommen ist. Wenn dieser nicht verfügbar ist, kann auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden.

Zur Auffrischungsimpfung mit Spikevax®: 0,25 ml (entspricht 50 µg mRNA, was der Hälfte der während der Grundimmunisierung verabreichten Menge entspricht)

Bei schwer Immunsupprimierten: dritte Dosis im Rahmen der Grundimmunisierung mit 0,5 ml (entspricht 100 µg mRNA)

\*\* Bitte beachten Sie, dass das Stellungnahmeverfahren der STIKO zur Auffrischung aktuell läuft.

### Wer soll eine Auffrischimpfung bekommen?

Die STIKO empfiehlt „allen Personen ab 18 Jahren eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff. Die Auffrischimpfungen soll in der Regel im **Abstand von 6 Monaten** zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf 5 Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden.“ (Bitte beachten Sie, dass sich diese Empfehlung aktuell noch im Stellungnahmeverfahren befindet.)

Beide mRNA-Impfstoffe sind für eine Auffrischimpfung nach 6 Monaten zugelassen.

Das BMG und die KBV empfehlen: „Der gemäß Zulassung vorgesehene Abstand von sechs Monaten zur vollständigen Immunisierung bei Personen ab 18 Jahren ist als zeitliche Richtschnur zu verstehen, der natürlich nicht tagesgenau einzuhalten ist.“